

Buccolam oralt (antiepileptikum i mundhulen)		
Instruks		
Borgermålgruppe: Børn og unge under 18 år Gældende for: Medarbejdere, Sundhed og Omsorg Medarbejdere, HOPS Medarbejdere, Private leverandører Medarbejdere, Børn og Familie	Gældende fra: September 2020 Revisionsdato: Januar 2022 Næste revisionsdato: Januar 2025	Udarbejdet af: Aniette Weibrecht Godkendt af: Styregruppe for instrukser

Formål

At sikre korrekt håndtering ved indgift af antiepileptikum i mundhulen (Buccolam oralt)

Definitioner

Buccolam er et [Antiepileptikum](#) af benzodiazepingruppen. Indholdstoffet er Midazolam.

Buccolam anvendes til behandling af langvarige, akutte [krampeanfald](#) hos børn.

Ansvar og kompetencer

Sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter kan varetage indgift af Buccolam mundhulevæske.

Social og sundhedshjælpere, pædagoger og terapeuter kan efter individuel delegation, varetage indgift af Buccolam mundhulevæske hos borgere med diagnosticeret epilepsi, hvor præparatet er ordineret af en læge.

Der skal foreligge en handleplan med anfaldsbeskrivelse, for at opgaven kan delegeres.

Fremgangsmåde

Før indgift af buccolam mundhulevæske

- Tidspunkter for anfaldets start registreres.
- Generelt gives Buccolam mundhulevæske efter anfaldsvarighed på 3 – 5 min. Der kan være individuelle ordinationer på anfaldsvarighed, inden indgift af Buccolam mundhulevæske. Se borgerens elektroniske journal.
- Tjek om borgeren har ordineret Buccolam mundhulevæske og hvilken dosis.
- Tjek at det stemmer med medicinskemaet.
- Borgeren ligger eller sidder.
- Brug engangshandsker.
- Fjern hættten fra den orale sprøjte. Der skal ikke benyttes kanyle.

Indgift

- Buccolam gives i siden af munden mellem gummer og kind.
- Hver sprøjte er fyldt med den dosis, der er ordineret til borgeren.
- Fordel evt. dosis med halvdelen i hver side af munden.

- Al medicinen sprøjtes langsomt ind. Det skal optages af slimhinden i mundhulen – ikke synkes.
- Anfaldet ophører sædvanligvis efter max. 5 min.

Efter indgift af Buccolam mundhulevæske

- Når kramperne er ophørt, sørg for frie luftveje ved at lægge borgeren på siden.
- Bliv ved barnet eller den unge, til vedkommende er ved bevidsthed igen og i sin vanlige status.
- Registrer hændelsesforløb og PN medicingivning i den elektroniske journal.

Tilkald læge eller ring 112, hvis

- Kramperne varer i mere end 5 min.
- Serier af anfald uden pauser
- Anfaldet er anderledes eller længere end tidligere set
- Anfaldet sker under badning
- Beboeren er længere/mere konfus og desorienteret end normalt ved anfald
- Beboeren er kommet til skade.
- Anfaldet er fulgt af høj temperatur

Se evt. førstehjælp ved epilepsianfald:

<http://www.epilepsiforeningen.dk/epilepsi/foerstehjaelp/>

Dokumentation

Respirationsproblemer skal altid være udredt i Helbredstilstanden "Problemer med respiration" (Sygeplejefagligt problemområde: Respiration og Cirkulation).

I handlingsanvisninger beskrives hvilke retningslinjer der følges hos den enkelte borger.

Referencer

Epilepsiforeningen.

<http://www.epilepsiforeningen.dk/epilepsi/film/>

<https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7091>