

Stesolid Klysma rektalt		
Instruks		
Borgermålgruppe: Alle borgere der modtager indsatser i henhold til sundhedsloven Gældende for: Medarbejdere, Sundhed og Omsorg Medarbejdere, HOPS Medarbejdere, Private leverandører Medarbejdere, Børn og Unge	Gældende fra: August 2016 Revisionsdato: Januar 2020 Næste revisionsdato: Januar 2022	Udarbejdet af: Aniette Weibrecht Godkendt af: Styregruppe for instrukser

Formål

At sikre korrekt håndtering ved indgift af klysma Stesolid rektalt.

Ansvar og kompetencer

Sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter kan varetage indgift af klysma Stesolid rektalt.

Social og sundhedshjælpere og personale uden lægemiddel kompetence, kan efter individuel delegering, varetage indgift af klysma Stesolid rektalt hos borgere med diagnosticeret epilepsi og lægelig ordination af klysma Stesolid. Der skal foreligge en handleplan med anfaldsbeskrivelse for borgeren, for at opgaven kan delegeres.

Fremgangsmåde- Procedure

Før indgift med klysma stesolid rektalvæske:

- Tidspunkter for anfaldets start registreres.
- Generelt gives Stesolid efter anfaldsvarighed på 3 – 5 min. Der kan være individuelle ordinationer på anfaldsvarighed, inden indgift af klysma Stesolid Rektalvæske. Se borgerens elektroniske journal.
- Tjek om borgeren har ordineret klysma Stesolid Rectalvæske og hvilken dosis.
- Tag bukser og underbenklæder af borgeren.
- Læg borgeren på venstre side.
- Brug engangshandsker.
- Bryd forseglingen på beholderen.

Indgift af klysma stesolid rektalvæske:

- Før forsigtigt spidsen af beholderen ind i borgeren's endetarm.
- Tøm beholderen, ved at klemme på beholderen.
- Det er vigtigt at beholderen forbliver sammenpresset, når plastspidsen igen trækkes ud

- Træk spidsen langsomt ud.
- Klem borgerens balder sammen med hænderne ca. 3 minutter for at forhindre væsken i at løbe ud igen.
- På spidsen af beholderen, er der markeret en ring i plastikken. Fra spidsen af beholderen og til denne markering, er det tilladt, der er væske tilbage i beholderen.
- Anfaldet ophører sædvanligvis efter max. 5 min.

Efter indgift med klyasma stesolid rektalvæske:

- Når kramperne er ophørt, sørg for frie luftveje ved at lægge borgeren på siden.
- Bliv ved borgeren, til vedkommende er ved bevidsthed igen og i sin vanlige status.
- Registrer hændelsesforløb og PN medicingivning i den elektroniske journal.

Tilkald læge eller ring 112 hvis:

- Kramperne varer i mere end 5 min.
- Serier af anfald uden pauser
- Anfaldet er anderledes eller længere end tidligere set
- Anfaldet sker under badning
- Beboeren er længere/mere konfus og desorienteret end normalt ved anfald
- Beboeren er kommet til skade.
- Anfaldet er fulgt af høj temperatur

Opbevaring

Klyasma Stesolid rektalvæske opbevares i aflåst skab.

Referencer

Epilepsiforeningen.

<http://www.epilepsiforeningen.dk/epilepsi/film/>

Epilepsiforeningen.

[Udviklingshæmmede: Film om epilepsi hos mennesker med udviklingskæmning](#)